



Aan het College van B&W van Vught, per e-mail: zon-wind@vught.nl

BETREFT: REACTIE OP CONCEPT PLAN-MER GROOTSCHALIGE OPWEK

Vught, 19 maart 2024

Geacht College,

Op de Concept-PlanMER voor grootschalige opwek voor Vught hebben wij de volgende zienswijze. Op 24 november 2023 stuurden wij u hierover een memo. Deze zienswijze haakt daarop aan.

IVN/NMV komt op voor natuur, landschap en milieu. Wij zijn voor schone energie maar tegen schade aan natuur en landschap. Wij dringen aan op grote voorzichtigheid met grootschalige opwek.

In tabel 8.1 van de Ecologische Risicoanalyse staat dat in alle zoekgebieden (grote) negatieve effecten op de natuur kunnen ontstaan. Nader onderzoek moet zekerheid geven. Niet alleen over gevolgen voor fourageergebied door zonneweides, maar bij windmolens ook naar het effect van geluid, slagschaduwen en optische verstoring op weidevogels, eendenkooien of bevers in het Drongelens Kanaal. Aannames en verwachtingen daarover, zoals nu in het document, volstaan niet.

De Ecologische Risicoanalyse noemt niet alle relevante te onderzoeken vogelsoorten. In de bijlagen hierna staan soorten die in de Gement voorkomen. Er mogen geen relevante soorten vergeten worden. Wij vrezen dat deugdelijk 'potential biological removal' onderzoek hier een te hoge sterfte oplevert. Wij vragen ons af of Britse gegevens (p. 25: BTO Birdfacts) bruikbaar zijn voor Nederlandse situaties. Onderzoek in verschillende jaargetijden is nodig. Voor vleermuizen volgens het voorgeschreven protocol. Ook moeten de cumulatieve effecten met andere plannen en projecten worden gezien. Voor zonneweides pleiten wij voor naleving van de [gedragscode zon op land](#).

Sovon geeft in een [Achtergronddocument](#) kwetsbaarheidsscores voor vogels door windmolens. O.m. kleine zwaan, wulp, blauwe kiekendief en wespandief scoren hoog. Kleine zwaan (hoogste kwetsbaarheid) overwintert in de Gement. Het [Profieldocument Kleine zwaan](#) zegt dat voor deze soort geen verdere achteruitgang mag optreden en dat windmolens barrières zijn (pag. 591).

In de Gement liggen ook twee eendenkooien. Wij vragen u het hiervoor geldende [afpalingsrecht](#) van ca. 750m in acht te nemen, ook voor wat betreft geluid, slagschaduwen en optische verstoring. De Ecologische Risicoanalyse zegt dat hierover *op hoofdlijnen* nader onderzoek wordt gedaan. Dat is o.i. ontoereikend.

Hoogvliegende vleermuizen als de rosse vleermuis zijn kwetsbaar bij windmolens. Deze zijn waargenomen in/nabij de zoekgebieden. In het [Bouwstenendocument](#) (pag. 4) staan afspraken over windmolens en vleermuishabitats, met name bosranden nabij water, zoals hier. De Gement is hoog-risico-locatie.

Onder het tabblad 'Mitigerende maatregelen' staan t.a.v. vogels diverse aannames die stoelen op verouderde onderzoeken (uit 2009 en 2014). Hier mag o.i. niet meer vanuit worden gegaan.



Met vriendelijke groet,

<was getekend>

Peggy Bannier, voorzitter

Sander Wieringa, secretaris

BIJLAGE 1: HEATMAPS Kleine Zwaan en Rosse Vleermuis NABIJ ZOEKGEBIEDEN WIND 1 EN 2



Bijlage 2: SOORTEN IN DE GEMENT

Onderstaand een lijst van beschermde soorten die in de Vughtse Gement zijn waargenomen.

De Gement is een kwalitatief hoogwaardig vogelgebied.

Rood = slechte staat van instandhouding, sterftetoe name kritisch.

Onderstreept = hoge kwetsbaarheid voor windmolens.

VOGELS

Aalscholver
Bergeend
Bergeend
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bokje
Bontbekplevier
Bonte strandloper
Bosruiter
Brandgans
Bruine kiekendief
Buizerd
Canadese gans
Casarca
Dodaars
Gaai
Gele kwikstaart
Gierzwaluw
Goudplevier
Graspieper
Gauwe gans
Groenpootruiter
Groene specht
Grote Pieper
Grote zilverreiger
Grutto
Havik
Holenduif
Houtduif
Houtsnip
Huiszwaluw
IJslandse grutto
Ijsvogel
Kauw
Kemphaan

Kievit
Kleine Karekiet
Kleine Plevier
Kleine rietgans
Kleine zwaan
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Kolgans
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Kuifeend
Kwartel
Lepelaar
Matkop
Meerkoet
Nachtegaal
Nijlgans
Noordse kwikstaart
Ooievaar
Oeverloper
Oeverzwaluw
Paapje
Pijlstaart
Purperreiger
Regenwulp
Rietzanger
Roerdomp
Roodborsttapuit
Roodhalsgans
Scholekster
Slechtvalk
Slobeend
Smient
Spotvogel
Spreeuw
Steenuil

Steltkluut
Stormmeeuw
Tafeleend
Tapuit
Temmincks strandloper
Toendra rietgans
Torenavalk
Tureluur
Veldleeuwerik
Waterhoen
Waterpieper
Watersnip
Wespendief
Wilde eend
Wilde zwaan
Wintertaling
Witgat
Witte kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zeearend
Zilverplevier
Zilverreiger
Zomertaling
Zwarte ibis
Zwarte ooievaar
Zwarte ruiter
Zwarte stern
Zwarte zwaan

VLEERMUIZEN

Bosvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Tweekleurige vleermuis